



پروش مرغ بومی

نگرانی ۷۰٪

برداشت	مرغ بومی
اداره رسانه های آموزشی و مدیریت مهندسی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی	
مدیریت امور طیور / معاونت بهبود تولیدات دامی	با همتایی
شرکت خدمات ترویج کشاورزی «ندای صریح»	میری طرح
بنگان بسطی	توسطه
روجبلش	با همتایی
کارشناسان طی	افتخیر این اتفاق
دستور اجرایی و فنی استار	افتخیر این اتفاق
گرافیک و صفحه آرایی	سید علی ریدانی شریعت
فناخته مهندسی / زیست پزشی زاده	افتخیر این اتفاق
لنس	چاپ
****	جهاد
آخر ماه ۱۳۹۷	زمان چاپ

بر اساس مصوبه شورای فناوری / مدیریت مهندسی ترویج کشاورزی / سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی کد: AY-1+2A

فهرست

۱	مقدمه
۲	دلالات اهمیت پرورش و نگهداری مرغ بومی در روستاها
۳	انتخاب نژادهای تخم گذار
۴	پرورش جوجه بومی پیکروزه
۵	پرورش نیمچه بومی
۶	استفاده از تخم نطفه دار برای جوجه کشی
۷	جاپنگاه مرغ
۸	- دلالات ساخت جاپنگاه
۹	- شرایط جاپنگاه
۱۰	- مقدار خضای لازم برای جاپنگاه (دارای سقف)
۱۱	- مقدار خضای بالز (بدون سقف)
۱۲	- محل خواب
۱۳	- محل تخم گذاری (آن)
۱۴	بهداشت جاپنگاه
۱۵	تغذیه مرغ بومی
۱۶	آب مصرفی مناسب
۱۷	رحمات بهداشت و پیشگیری از بیماری ها
۱۸	بیماری های طیور
۱۹	بیماری نیوکالسل
۲۰	- پیشگیری و کنترل
۲۱	بیماری آنفلوآنزا مرغی
۲۲	- پیشگیری و کنترل

پرورش خلیور به ویژه مرغ بومی از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده است. خانواده‌های روستایی و عشايری، با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آنها را پرورش می‌دادند و با استفاده از گوشت، تخم و پر آنها، بخشی از نیازهای افراد خانواده را بر طرف می‌کردند. همچنین مقدار اضافی مرغ و تخم مرغ تولیدی را به شهرها برده و می‌فروختند.

امروزه نیز در بیشتر روستاهای کشور با کمترین هزینه و امکانات، پرورش مرغ بومی به صورت گله‌های کوچک انجام می‌شود. هر چند این گله‌ها معمولاً به علل بهداشتی، تغذیه‌ای و زنگنه‌کی تولید و بازده کمی دارند و نقش آنها در اقتصاد و تغذیه روستاییان محدود می‌باشد.

خوبشخانه با توجه و عنایت خاصی که وزارت جهاد کشاورزی به امر حفظ و اصلاح نژادهای بومی داشته است، مراکز پشتیبانی، اصلاح نژاد و ترویج مرغ‌های بومی، زیر نظر معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی، در مناطق مختلف کشور راه اندازی گردیده و در حال حاضر بیش از دو دهه از فعالیت این مراکز می‌گذرد. این مراکز علاوه بر حفظ و افزایش کیفی منابع بومی، به تولید و توزیع جوجه‌های یکروزه بومی و تخم مرغ نطفه دار بومی می‌پردازند. از این رهگذار افزون بر رونق دیگر بار تولید و پرورش مرغ‌های بومی، به امر اشتغال زایی و بهبود وضع اقتصادی و تغذیه‌ای در روستا نیز کمک می‌شود. با تهیه جوجه‌های بومی از این مراکز و با آموختن روش‌های درست پرورش مرغ بومی، می‌توان این کار را به صورت پیش‌ای درآمد زا در مناطق روستایی و عشايری کشور، گسترش و رونق داد.



دلایل اهمیت پرورش و تکهداری مرغ بومی در روستاها

- حفظ ذخایر بر ارزش زنیکی مرغ‌های بومی، بهبود تغذیه روستایان، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد آنان.
- کاهش بخشی از نیاز کشور به مواد خوراکی طیور مثل ذرت، سویا، گندم، جو و... که از خارج تأمین می‌شود.
- مقاومت مرغ بومی در برابر شرایط نامساعد زیستی و بیماری‌ها.
- امکان نگهداری مرغ بومی، با کم ترین هزینه و فقط با مصرف باقیمانده سفره و خرایعات کشاورزی.
- مقبولیت تولیدات طیور بومی به عنوان محصول ارگانیک (که بدون استفاده از دارو پرورش یافته‌اند) در میان مصرف کنندگان.
- بیشتر بودن مزیت پرورش مرغ بومی در بسته، نسبت به نگهداری در قفس.
- گوشت مرغ و تخم مرغ دارای ارزش غذایی زیادی بوده و تأمین کننده پروتئین حیوانی روستایان می‌باشد.
- تهیه محل و جایگاه پرورش مرغ، برای روستایان بسیار آسان تراز فراهم کردن محل و جایگاه برای پرورش دیگر حیوانات اهلی می‌باشد.



- در شرایط زندگی عشاپری که اغلب بخچال وجود ندارد، نگهداری تخم مرغ بسیار ساده‌تر از سایر منابع پرتوئینی است. (تخم مرغ‌های بی نطفه، در درجه حرارت معتدل، کیفیت خود را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز حفظ می‌کنند).
- گوشت مرغ به خاطر سهل الهضم بودن، می‌تواند غذایی مناسب برای افراد کهنسال یا بیمار روستایی باشد.
- نگهداری و پرورش مرغ‌های بومی، به دلیل نیاز نداشتن به امکانات و تجهیزاتی که در پرورش مرغ‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز داشتن مقاومت بیشتر و سازگاری با اقلیم بومی، آسان‌تر است.
- خانوارهای روستایی قادر زمین نیز، توانایی نگهداری از چند قطعه مرغ را با حداقل امکانات دارند.
- زنان و دختران روستایی به عنوان یک نیروی کار مناسب می‌توانند مدیریت و نگهداری از یک گله کوچک مرغ را بر عهده گیرند که درآمد جنبی حاصل از آن، در اقتصاد خانوار روستایی اهمیت زیادی دارد.
- پرورش مرغ بومی و تولیدات آن، واحد تولیدی کوچکی را به وجود می‌آورد که نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد.
- با نگهداری و پرورش طیور، خانوار روستایی به ویژه کودکان، با پرندگان، بیش از پیش خوبی می‌گیرند و می‌توانند سرگرمی خوبی برای آنان باشد.



انتخاب نژادهای تخم‌گذار

از نظر ظاهری، مرغ تخم‌گذار، سرحال، قوی پر حرک و بسیار پرخور است. به تدریج که میزان تخم‌گذاری زیاد می‌شود، رنگدانه‌های بدن، کاهش می‌یابد. جوجه‌های نژاد تخم‌گذار از ۴ تا ۶ ماهگی به تخم می‌آیند. به علاوه، جوجه خروس‌های این نژاد هم زودتر به بازار مصرف می‌رسند. حدود ۱۸ تا ۲۰ مرغ بومی تخم‌گذار، می‌تواند برای یک خانوار ۶ نفری، دست کم یک تخم مرغ به ازای هر نفر در روز تولید نماید.

برای شروع کار تکهداری و بروش مرغ، راه‌های متفاوتی وجود دارد:

- استفاده از مرغ بومی تخم‌گذار.
- استفاده از تخم مرغ نطفه دار برای جوجه کشی.
- خرید جوجه یک‌روزه بومی مناسب از مراکز تأیید شده.
- خرید جوجه ۱ تا ۲ ماهه و بروش آنها (این روش، هرچند از روش‌های قبلی کمی گران تر است، اما مطمئن‌تر می‌باشد و برای بار اول پیشنهاد می‌شود).



برورش جوجه بومی یکروزه

جوجه‌های یکروزه باید تا چند هفته اول در محلی گرم، نگهداری شوند. این محل معمولاً شامل یک منبع تولید کننده گرما و یک سریناگ می‌باشد که دمای لازم را برای پرورش جوجه‌ها تأمین و حفظ می‌کند. منبع تولید کننده گرما ممکن است برقی، گازسوز یا نفتی باشد.

بطور کلی در مورد محل نگهداری جوجه‌ها، با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی، باید ۴ عامل؛ عایق بندی، تهویه، منبع گرم کننده و منبع خنک کننده مورد توجه قرار گیرد.

دمای محل نگهداری جوجه‌های یکروزه در ابتدا باید حدود ۳۲ تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد. با رشد و پردرآوردن، به تدریج نیاز آنها به دمای محیط کاهش می‌یابد و باید کم کم دمای را کاهش داد، تا در ۷ تا ۹ هفتگی به حدود ۲۲ درجه برسد.



برای رسیدن به رشد مطلوب، دسترسی به غذا در ساعت‌های اولیه ورود جوجه‌ها اهمیت دارد. ماه اول (به ویژه هفته اول)، زمان حساس در زندگی جوجه‌ها محسوب می‌شود. در روز اول تولد، ۱۲ تا ۲۴ ساعت نباید دان در اختیار جوجه قرار داد، چون باقیمانده زرده در بدن جوجه‌ها، برای تغذیه آنها کافی است. بعد از آن نیز در صورت امکان، ۱۲ تا ۱۶ ساعت از آرد ذرت به تنهایی استفاده شود. سپس می‌توان از غلات یا خوراک‌های دیگر به صورت آردی (کوپیده شده) استفاده کرد. توصیه می‌شود به هیچ وجه از آرد گندم در هفته اول زندگی جوجه‌ها در جیره غذایی آنها استفاده نشود.

بهتر است تا حد امکان برای قوی و آماده شدن جوجه‌ها برای مراحل بعدی رشد، در ۲ هفته اول از دان مخصوص جوجه‌ها با سن پایین که توسط شرکت‌های معابر ارایه می‌شود و حاوی مکمل‌ها و ویتامین‌های لازم می‌باشد، استفاده کرد. نباید از دانه‌ی کامل برای جوجه‌ها در هفته اول استفاده کرد. به علاوه باید دقت کرد که در لانه و مسیر حرکت جوجه‌ها دانه سالم ریخته نشده باشد.



دسترسی
نهایی

مهم ترین مشکل مرغداری بومی در کشور ما، زیاد بودن تعداد تلفات جوجه هاست که با انجام برخی اقدامات، می توان تلفات را کاهش داد.

* **از عوامل مهم تلفات جوجه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:**

- ۱- بیماری ها، مراجعت نکردن به موقع به دامپزشکی و نزدن واکسن لازم، باعث مرگ و میر جوجه ها می شود.
- ۲- مراقبت نکردن به موقع و مناسب، از جمله عدم تهیه دان خوری و آب خوری مناسب با تعداد و سن جوجه ها، می تواند موجب بروز آسیب های فیزیکی به آنها شود.
- ۳- فراهم نبودن شرایط بهداشتی جایگاه، تغذیه و آب آشامیدنی.



پرورش نیمچه بومی

- در مورد پرورش نیمچه، می‌توان جوجه‌های ۶ تا ۸ هفته را از مراکز مورد تایید خریداری کرد. نگهداری این نوع گله پرورشی، آسان‌تر بوده و در مقایسه با پرورش جوجه یکروزه، محصول مورد نظر (تخم مرغ) زودتر تولید می‌شود.
- بطور معمول پولت‌ها در سن ۲۰ تا ۲۴ هفتگی شروع به تخم گذاری می‌کنند.
- حتماً پیش از سفارش و خرید جوجه، محل مورد نظر برای نگهداری آن‌ها باید آماده شود.
- محل مورد نظر از نظر حضور حشرات، جوندگان، خزندگان و جانوران موذی بررسی و کنترل گردد.
- برای هر ۱۰ جوجه، حدود یک متر مربع لازم است. برای پولت‌ها (بعد از سن ۸ هفتگی) حدود دو برابر این مقدار، فضا مورد نیاز می‌باشد (یعنی به ازای هر ۱۰ مرغ، حدود ۲ متر).



- دست کم دوبار در هفته لانه مرغ‌ها و تجهیزات آن (آب خوری، دان خوری و...)
تمیز ژوند.
- پیش از ریختن بستر در کف لانه‌ها، از خشک بودن کف لانه اطمینان حاصل شود.
- خسخامت بستر باید در زمستان بیشتر بوده و تا حد ممکن خشک باشد.

استفاده از تخم نطفه دار برای جوجه کشی

یکی دیگر از راه‌های بهره‌وری و برورش مرغ‌بومی، تهیه تخم نطفه دار بومی از مراکز تأیید شده برای جوجه کشی می‌باشد. به این منظور دستگاه‌های جوجه کشی با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف در بازار موجود می‌باشد. بهتر است برای آغاز کار و پیش از تهیه دستگاه جوجه کشی، با کارشناسان امور دام جهاد کشاورزی مشورت شود.



آموزش ایمنی
برای مرغ



اول: دلایل ساخت جایگاه برای مرغ ها

- ۱ - محافظت آنها از باد، برف، باران، نور مستقیم خورشید و تغییرات شدید آب و هوایی،
- ۲ - کنترل روشنایی و میزان نوردهی،
- ۳ - جلوگیری از شکار شدن آنها توسط دیگر حیوانات،
- ۴ - محافظت و کنترل آسان تر جوجه ها،
- ۵ - جلوگیری از تغذیه آنها با غذا و آب های آلوده و کنترل غذا و آبی که به مرغ ها داده می شود،
- ۶ - جمع آوری راحت تر تخم مرغ ها در جایگاه و کاهش آلودگی و شکستگی آنها،
- ۷ - پیشگیری از گسترش بیماری ها.



دوم: شرایط جایگاه

- ۱- با توجه به نوع آب و هوا و امکانات روستا، جایگاه مرغ از آجر، سنگ، بلوک سیمانی و... ساخته شود.
- ۲- کف جایگاه باید از زمین بلندتر باشد. جنس کف آن سیمانی بوده و شب ملایم داشته باشد تا هم به راحتی شسته شود و هم آب در آن جمع نشود. شب جایگاه باید به طرف پشت آن باشد.
- ۳- استفاده از کاه و کلش (پوشال) یا خاک اره به قطر ۵ تا ۱۵ سانتی متر در بستر جایگاه، (با توجه به فصل و دمای محیط) ضروری می باشد.
- ۴- دیوار و سقف جایگاه باید از موادی ساخته شده باشد که بدون هر گونه شکاف و خلل و فرجی باشد. در صورت امکان، بهتر است سیمان کاری شود.
- ۵- جایگاه نباید در محل بادگیر ساخته شود.
- ۶- جهت جایگاه باید طوری باشد که درب آن، به طرف جنوب بوده و آفتاب داخل آن بتابد.
- ۷- جایگاه مرغ باید طوری ساخته شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد.
- ۸- برای مرغ ها چوب خواب در نظر گرفته شود تا در هنگام شب روی آن استراحت کند.



سوم: مقدار فضای لازم

در جایگاه باید فضای کافی برای مرغ ها فراهم باشد. چنانچه تعداد زیادی مرغ در یک فضای کوچک نگهداری شوند، شروع به نوک زدن همدمیگر خواهند کرد و اگر پرنده ای زخمی شود مشکل بیشتر شده، «خود خوری» رواج پیدا می کند. جوجه ها نسبت به مرغ ها به فضای کم تری نیاز دارند.

چهارم: فضای مناسب برای جایگاه

- ۱) ۵۰ جوجه را تا سن ۲ ماهگی می توان در شش متر مربع (۳ در ۲ متر) بروزش داد.
- ۲) یک متر مربع برای هر ۵ مرغ و خروس بالغ کافی است.

پنجم: احداث فضای باز

در نظر گرفتن فضای باز در محوطه جلوی جایگاه برای مرغ ها لازم است تا بتوانند در آنجا فعالیت کنند و از هوای آزاد استفاده نمایند.

فضای باز باید با توری محصور شده باشد. بهتر است در قسمتی از آن سایه بان ساخته شود تا در روزهای بارانی مرغ ها را محافظت کند. مساحت آن معمولاً ۲ برابر مساحت لانه است و برای هر چهار مرغ، دو متر مربع فضای آزاد لازم است. کاشت بعضی از علوفه، مثل جو و شبدر در محل گردش مرغ ها، برای استفاده آذان مفید است.



ششم: محل استراحت

چون بر حسب غریزه، مرغ‌ها عادت دارند در جاهای بلند استراحت کنند، نصب چوب خواب در آشیانه بسیار مفید بوده و باعث می‌شود مرغ‌ها از نشستن روی ظروف آب خوری و دان خوری خودداری کنند. در نتیجه این ظروف کمتر در معرض آلودگی به مدفعه قرار می‌گیرند.

- خسارت چوب در حدود ۳ سانتی متر،
 - طول آن به ازای هر مرغ ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر
 - و ارتفاع «برای جوجه‌ها ۴۰ سانتی متر» و «برای مرغ‌ها، بالغ بر ۹۰ سانتی متر» باشد.

هفتادم: محل تخم گذاری (لاته)

وجود محل تخم گذاری کافی، باعث افزایش تعداد و حفظ کیفیت تخم مرغ ها می شود. همچنین جمع آوری تخم مرغ ها راحت تر شده و آسودگی و شکستگی آنها به حداقل می رسد.

لازم است در یک قسمت جایگاه، محلی برای تخم گذاری مرغ ها در نظر گرفته شود. کف محل تخم گذاری باید پوشال بوده و طوری باشد که جرم آوری تخم ها به راحتی انجام شود.

برای هر ۴ تا ۶ مرغ تخم گذار، یک لانه برای تخم گذاری در نظر گرفته شود. بطوری که هر مرغ به راحتی بتواند داخل لانه شده و از آن خارج گردد. پیشنهاد می‌شود «عرض کف لانه حدود ۳۵ سانتی متر» و «طول آن ۳۵ سانتی متر» در نظر گرفته شود. بهتر است ارتفاع لانه از زمین، حدود ۶۰ سانتی متر باشد. جنس لانه‌ها می‌توانند فلزی یا چوبی باشد. سقف لانه محکم و شیب دار ساخته شود تا از پریدن و نشستن مرغ‌ها بر روی آن پیشگیری شود.



جمع آوری فضولات مرغ‌ها از جایگاه‌ها، از شیوه بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. پس لازم است هر ۷ تا ۱۰ روز یک بار، فضولات درون جایگاه‌ها جمع آوری شده، کف جایگاه تمیز شود و بستر کف جایگاه نیز تعویض گردد.

شستشو و ضد عفونی مداوم و سایل مرغداری را هر چند نباید فراموش کرد. هر ۱۰ روز یک بار باید آب خوری‌ها و دان خوری‌ها را خوب شست و با مواد مناسب ضد عفونی کرد.

در جایگاه‌هایی که به صورت دوره‌ای در آن مرغ پرورش داده می‌شود، باید بعد از پایان دوره پرورش و خالی شدن آنها، سقف، دیوارها و کف جایگاه را ضد عفونی کرد.

جایگاه‌هایی که به طور دائمی در آنها مرغ نگهداری می‌شود، هر یک ماه تا ۴۵ روز یکبار باید ضد عفونی شوند.

برای ضد عفونی جایگاه می‌توان از آب آهک ۵ درصد (۵ کیلو آهک در ۱۰۰ لیتر آب) و یا محلول‌های ضد عفونی کننده موجود در داروخانه‌های دامپزشکی استفاده کرد. هنگام استفاده از این محلول‌ها باید به دستور تهیه و مصرف آنها توجه شود.

هر چند به طور مداوم نباید از یک ماده ضد عفونی استفاده کرد. مواد ضد عفونی کننده باید از دسترس کودکان دور نگه داشته شود و حتی در مسیر حرکت ماکیان و دام‌ها نیز قرار نگیرد.



کلیه احتیاجات مرغ‌های بومی روستاهای، تا حد امکان از همان منابع موجود در روستا یا منطقه تأمین خواهد شد. چنانچه در منطقه، موادی موجود باشد که:

- ✓ با انجام فرایندهای ساده (مانند سیلو کردن، خرد کردن و تبدیل کردن)
- ✓ یا مازاد و ضایعات کارخانهایی که در منطقه وجود دارد (مانند بوجاری و شالیکوبی)
- ✓ و یا گیاهان غیر مضر برای تکمیل دان بنواند مورد استفاده تغذیه مرغ بومی قرار نگیرد، در تغذیه آنها گنجانیده خواهد شد.

به طور کلی هدف اصلی از جیره غذایی مرغ‌های بومی، استفاده از منابع داخل روستا (بدون استفاده از نهاده‌های دامی وارداتی) می‌باشد.

بکی از خصوصیات بر جسته مرغ‌های بومی عادت داشتن به شرایط تغذیه‌ای در روستا است. این مرغ‌ها می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد غذای خودشان را از طریق چرای آزاد و بقیه آن را با غذای دستی تأمین کنند.

برای اینکه مرغ بومی تولید خوبی داشته باشد، باید تغذیه مناسب همراه با تأمین نیازهای غذایی انجام نگیرد. خوراک مرغ بومی مشکل از ضایعات کشاورزی، اضافه و دور ریز غذای روستاییان، پس چراغوفه و سبزی‌ها و جانداران ریز مانند بعضی از کرم‌ها و حشرات می‌باشد که می‌توان با اضافه کردن مقداری مکمل غذایی، کیفیت غذایی آنان را بالا برد.



دانه‌های شکسته و نامرغوب که از بوجاری گندم و جو به دست می‌آیند، سبوس گندم و برنج، تفاله‌های گیاهان زراعی، آشغال سبزی‌ها و گیاهان علوفه‌ای نیز غذای خوبی برای مرغ‌ها هستند.

در ضمن نباید فراموش کرد که مرغ‌ها و خروس‌ها باید همیشه بطور یکسان تغذیه شوند. یک مرغ به وزن ۱۷۰۰ گرم، روزانه به ۱۰۰ تا ۱۱۰ گرم غذای نیاز دارد. اگر در غذای دستی مرغ به مقدار کافی کلسیم وجود نداشته باشد، در چند روز اول، از کلسیم بدن برای تشکیل تخم مرغ استفاده می‌کند، ولی بعد از آن پوسته تخم مرغ نازک شده و کم کم تولید تخم مرغ باشند می‌آید.

برای تأمین کلسیم مورد نیاز طیور می‌توان از پودر استخوان، پودر صدف، خردش‌های سنگ آهک و مواد آهکی دیگر استفاده کرد. در پرورش به صورت چراچ آزاد، معمولاً مرغ‌ها تا حدودی کلسیم مورد نیاز خود را از خاک تأمین می‌کنند. غذاهای آماده که توسط شرکت‌های معتربر خوراک دام و طیور تهیه می‌شوند و در داروخانه‌های دامپزشکی موجود هستند، تقریباً تمام مواد مورد نیاز ماکیان را دارا می‌باشند. در صورت نیاز، خوب است علاوه بر غذاهای رایج در منطقه، مقداری هم از این نوع غذاها و جیره‌های آماده در اختیار طیور قرار گیرد. یک جوجه مرغ تا سن یک ماهگی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم دان آماده مصرف می‌کند. جوجه یکروزه، تا ۳ ماهگی به بروتیس بیشتری در جیره غذایی نیاز دارد تا بتواند به خوبی رشد کند.

در فصل‌های گرم سال، برای تحریک مرغ‌ها به خوردن، ضمن دادن غذا در ساعات خنک شبانه روز، می‌توان با افزودن مقداری آب به خوراک، آن را به صورت آماج در آورده به ازای هر مرغ «۱۰ تا ۱۵ سانتی متر دان خوری ناوданی» و یا «۵ سانتی متر دان خوری آویز» لازم است.



آب هصرفی مناسب

طیور به آب تازه و تمیز در تمام اوقات نیاز دارند. ۷۰ درصد بدن مرغ و ۶۵ درصد وزن تخم مرغ از آب تشکیل شده است. در شرایط معمولی هر ۴ مرغ در شبانه روز، یک لیتر آب مصرف می کنند. در آب و هوای گرم این مقدار بیشتر می شود.

در روزهای سرد سال باید مراقب بخ زدن آب خوری ها بود و در روزهای گرم برای خنک ماندن آب خوری ها، آنها را باید در زیر سایه قرار داد. کمبود آب ممکن است موجب بروز «تخم مرغ خوری» مرغها شود. برای هر ۵ قطعه مرغ، یک آب خوری کله قندی نیاز است.

هر فردی که بتواند از یک چکش و اره استفاده کند، می تواند دان خوری، آب خوری و وسایل لازم دیگر را خود بسازد. با کمی دقت، حوصله و ابتکار می توان لوازم دست ساز را در حد کیفیت لوازم موجود در بازار اما با هزینه کمتر ساخت. البته آب خوری، دان خوری و لوازم مربوط به آن را می توان از مراکز فروش لوازم مرغداری یا داروخانه های دامپردازی نیز تهیه کرد.



آب خوری
دان خوری
لوازم دست ساز

۱۹



رعایت پهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها

پیشگیری، همیشه ارزان‌تر، مؤثر‌تر و راحت‌تر از درمان است. پیشگیری از بیماری‌ها به سه عامل؛ ابهداشت مناسب، امدیریت درست و اواکسن زدن به موقع (ماهیه کوبی) بستگی دارد.

* چند تکنیک پهداشتی مهم

- ۱ - جوجه‌ها را باید در لانه‌هایی که قبلاً مرغ در آن بوده قرار داد، مگر این که لانه به طور کامل تمیز و ضد عفونی شود.
- ۲ - ظرف‌های آب خوری مرغ‌ها و جوجه‌ها باید به طور مرتب با پارچه تمیز و آب، شسته و پاکیزه شود.
- ۳ - دان خوری باید تمیز نگه داشته شود. همچنین دانه‌هایی که با فضولات مرغ‌ها و جوجه‌ها مخلوط شده و یا کپک زده‌اند، باید دور ریخته شوند.
- ۴ - از ورود مرغ‌های بیمار به جمع مرغ‌های سالم باید پیشگیری شود. محل نگهداری آنها باید در جایی جداگانه و دور از مرغ‌های سالم باشد.
- ۵ - لاشه مرغ‌ها و جوجه‌های مرده باید فوری از لانه خارج شده، سپس به همراه آهک در خاک دفن گردیده یا سوزانده شود.
- ۶ - از ورود طیور غریب و یا وحشی به لانه مرغ‌ها باید جلوگیری شود.



بیماری‌های مهم طیور

بیماری‌ها بر اثر عوامل مختلفی از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، قارچ‌ها، و نیز عوامل تغذیه‌ای به وجود می‌آیند. توجه داشته باشید که در پیشگیری از بیماری‌ها باید دستورالعمل‌های دامپزشکی را اجرا کرد و در هنگام مشاهده مرغ‌های بیمار، فوری به دامپزشکی مراجعه نمود.



بیماری نیوکاسل

۲۱
بیماری‌های طیور
دایمی

یکی از بیماری‌های شایع در مرغ‌ها، بیماری نیوکاسل است. این بیماری از یک نوع ویروس به وجود می‌آید و باعث عفونت دستگاه تنفس، گوارش و اعصاب مرغ می‌شود. بیماری نیوکاسل واگیردار است و در بسیاری از پرندگان مانند مرغ‌ها و بوقلمون‌ها دیده می‌شود. این بیماری در کشور ما از بیماری‌های خطرناک طیور به حساب می‌آید.

نشانه‌های بیماری شامل آبریزش بینی، خرخر کردن، اشکال در تنفس و صدایی شبیه سوت کشیدن و عطسه است. به علاوه، مرغ بسیار نفس نفس می‌زند، با دهان باز نفس می‌کشد، افسرده، گوشه گیر و بی اشتها می‌شود. کم کم نشانه‌های عصبی مانند فلنج ولرزش عضله‌ها نیز در حیوان به وجود می‌آید. بیماری نیوکاسل به سرعت (طی چند روز) به تمام مرغ‌ها منتقل می‌شود و می‌تواند باعث ابتلای تمام مرغ‌های یک گله شود.

* پیشگیری و کنترل بیماری:

مهم ترین راه پیشگیری از بیماری و مبارزه با آن، واکسن زدن و دور نگه داشتن مرغ ها از ویروس بیماری است. برنامه واکسن زدن به جووجهها باید با توجه به شرایط منطقه، نوع واکسن و طبق دستور دامپزشک باشد. هنوز برای این بیماری، راه درمان قطعی کشف نشده است. تنها با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از واکسن می توان از آلوده شدن طیور جلوگیری کرد. در صورت دچار شدن طیور به این بیماری، برای جلوگیری از انتشار آلودگی، باید همه آن ها را از بین ببریم. هنگام شیوع بیماری نبوكاسل، با جدا سازی طیور و مراجعه به دامپزشک، می توان بیماری را کنترل کرد.



بیماری آنفلوائزای مرغی

بیماری آنفلوائزای مرغی، یک عارضه حاد خیلی عفونی و ویروسی طیور است. شدت بیماری از حالت های غیر آشکار یا خفیف تا حالت های کشنده تغییر می کند. بیماری بسیار عفونی است و در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و فرزنده ای، در هنگام شیوع در یک منطقه می تواند سریعاً از گله ای به گله دیگر گسترش پیدا کند. در مرغ های جوان، تنها مرگ ناگهانی مشخص کننده بیماری است.

در موارد دیگر علایم ذیر ممکن است مشاهده شود:

- ۱- پرهای پژمرده و زولیده
- ۲- آفت ناگهانی در تولید تخم مرغ یا تولید تخم مرغ های با پوسته نرم
- ۳- از دست دادن اشتها و افسردگی، بی حالی و اسهال
- ۴- ایجاد رنگ صورتی مایل به آبی در ریش ها و ناج ها
- ۵- تورم سر، پلک ها و مفاصل پا
- ۶- خروج ترشحات خونی کم رنگ از سوراخ های بینی
- ۷- عدم نطابق که شامل از دست دادن نوان راه رفتن و ایستادن می شود
- ۸- و افزایش مرگ و میر ناگهانی در گله.

لازم به یادآوری است که علایم خارجی آنفلوائزای مرغی خیلی شبیه سایر بیماری های طیور است.

* پیشگیری از بیماری:

برای کنترل شکل خفیف بیماری، از یک برنامه واکسیناسیون با فرزنده استفاده می شود. در صورت مشاهده علایم آنفلوائزای مرغی یا حتی موردی مشکوک، باید فوری دامپزشک محلی را مطلع سازیم تا بیماری به شکل مطلوب و سریع، کنترل شود.

پرورش دهنده مرغ باید این نکته را بداند که:

با استی طیور را در برابر بیماری های مهم مثل مارک، نیو کاسل، گامبورو، برونیت و آبله واکسینه کند.



آموزش ایمنی
۲۳



طیور تلف شده را فوری از لانه خارج کرده و در محلی دور از لانه بین دو لایه آهکی دفن کرده یا بسوزاند.

و بالاخره مقدار داروها و زمان دقیق خوراندن آنها را به طور دقیق رعایت نماید.

نشانه‌ها و علائمی که باید در گله جدی گرفته شود:

- افزایش ناگهانی تلفات،
- عطسه، سرفه، لعله زدن و ترشحات بینی،
- مدفوع آهکی (اسهال)،
- کاهش اشتها و مصرف دان،
- کاهش تولید تخم مرغ،
- تولید تخم مرغ‌های با پوسته نازک، ناصاف و بدشکل،
- تورم اطراف چشم، گردن و سر،
- تغییر رنگ تاج، ریش و پا،
- رعشه، افتادگی بال‌ها، حرکت به صورت چرخشی، بیچ خوردگی سر و گردن، لکش و عدم حرکت.

* با مشاهده هر یک از علایم بالا، باید مرغ (های) مبتلا را از بقیه جدا کرده، دورتر نگهداری نموده و در اولین فرصت ممکن، به دامپزشکی اطلاع داده شود.

مواردی که در هنگام خرید جوجه یکروزه بومی، بایستی در نظر گرفته شود:

- جوجه‌ها از مراکز تأیید شده از سوی «معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی» خریداری شوند.

- از مراکز فروش جوجه، «گواهی بهداشتی جوجه یکروزه» درخواست گردد.
- مسافت مراکز فروش جوجه یکروزه تا محل نگهداری و پرورش در نظر گرفته شود تا انتقال و حمل جوجه‌ها، بدون اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن، انجام شود.
- وسائل نقلیه حامل جوجه‌های یکروزه باید سرپوشیده و بهداشتی بوده و تهییه، کولر و بخاری داشته باشد تا دما در هنگام انتقال، با توجه به زمان و فصول مختلف، قابل کنترل باشد.